

## Nosówka (ang. distemper).

Autor: Anita Zielonka</br>weterynarz

Przyczyną choroby jest wirus nosówki z rodziny Paramyxoviride. Wirus nosówki jest wrażliwy na czynniki środowiska zewnętrznego np. wysoka temperatura. Pomimo szczepień ochronnych choroba ta nadal powszechnie występuje u psów.

Na zakażenie wirusem nosówki oprócz psów wrażliwe są inne gatunki psowatych tj. wilk, lis, szakal, oraz z rodziny łąsicowatych m.in. fretka, tchórz, norka, łoś, kuna.

Zakażony pies wydalą wirus ze wszystkimi wydzielinami i wydaliniami np. mocz, ślina, wyływ z nosa, z worka spojówkowego.

Zakażenie może być drogą pośrednią (buty, ręce, ubranie), i drogą bezpośrednią (kontakt z innym psem).

Objawy kliniczne: przebieg nosówki i objawy chorobowe są zależne od postaci nosówki, szczepu zarazka, wieku zwierzęcia, powikłań bakteryjnych itd.

**NOSÓWKA NIEŻYTOWA:** wzrost temperatury, spadek apetytu, osowiałość, zapalenie spojówek, biegunka, potem następuje okres poprawy i spadku temperatury, a po nim kolejny wzrost ciepłoty wewnętrznej i pogorszenie stanu ogólnego - występuje wyływ ropny z worka spojówkowego i wyływ ropny z nosa, brak apetytu. W konsekwencji często przechodzi w

**POSTAĆ ODDECHOWĄ** - zapalenie oskrzeli, odoskrzelowe zapalenie płuc.

**POSTAĆ JELITOWA**- wymioty, biegunka a co za tym idzie odwodnienie i wychudzenie. Jeśli w tym czasie zachodzi wymiana zębów z mlecznych na stałe dochodzi do uszkodzenia szkliwa co powoduje jego brązowe zabarwienie.

**POSTAĆ OCZNA** - owrzodzenie rogówki, perforacja rogówki, zapalenie tęczówki, zmiany w siatkówce.

**POSTAĆ SKÓRNA** - krostki i pęcherzyki na skórze brzucha, wewnętrznej stronie ud, na małżowinach usznych i innych słabo owłosionych częściach ciała.

**CHOROBA TWARDEJ ŁAPY** - hiperkeratoza opuszek palcowych i lusterka nosa, która pojawia się po kilku tygodniach choroby.

**POSTAĆ NERWOWA** - występuje z innymi postaciami nosówki lub może wystąpić bez poprzedzających objawów wskazujących na nosówkę lub zaczyna się po okresie wyzdrowienia z postaci nieżytowej nosówki. Objawami są różnego rodzaju niezdolności, niedowład, porażenia, titki, drżenia mięśniowe, skurcze toniczno-kloniczne, a w końcowym etapie padaczka.